TUMOR RENAL

METASTATIZANTE

Francisco Giner Segura, Pilar Soriano Sarrió, Maria del Carmen Gómez Mateo, Veronique Benavent Corai, Antonio Ferrández Izquierdo.

Hospital Clínic Universitari de València.

Historia Clínica

- Varón de 73 años.
- AP: cólicos nefríticos y pielolitotomía.
- Ingresa por:-hematuria franca
  -tumoración abdominal en vacío derecho.
  -sd. Constitucional desde hace un mes.

Exploraciones complementarias

- TAC: masa de 22x13x13cm, irregular, de captación heterogénea en polo inferior del riñón derecho con nódulo hepático.
- Se recibe pieza de nefrectomía y hepatectomía parcial.

Anatomía patológica

Macroscopía

- Nefrectomía de 17x15x11 cm.
- Tumoración de 14x11x13 cm.

H.C.U.V.
A.Pat.

Microscopía
















VIM


CK AE1/AE3


CK AE1/AE3


CK-7


p63


desm

diagnóstico

Carcinoma renal sarcomatoide

- 1% tumores renales del adulto
- Sinónimos: carcinoma fusocelular, carcinoma anaplásico y carcinosarcoma.
- DxD: sarcoma pleomórfico indiferenciado, fibrosarcoma, rabdomiosarcoma, angiosarcoma, carcinoma renal con características rabdoides y sarcoma alveolar de partes blandas.
- **La clave: presencia de componente epitelial!!!**

Pronóstico

- Pobre en general.
- 30 meses en estadios precoces
- 21 meses en estadios avanzados
- 60% metástasis en el momento del diagnóstico.